

Buikpijn bij kinderen en jongeren komt veel voor en gaat meestal over. Er is echter een groep kinderen die elke dag hevige buikpijn heeft.

De gevolgen zijn voor dat kind, en de ouders, groot. Niet zelden heeft de buikpijn grote invloed op het dagelijks leven.

Maar dat is niet nodig. Op de buikpijn poli worden kinderen snel geholpen.

Met een behandeling op maat kan de buikpijn tot het verleden behoren.

Buikpijn is te verhelpen.

Buikpijn: een veel voorkomend en ernstig probleem

Onderzoek wijst uit dat meer dan 15% van de kinderen onder de 14 jaar last heeft van chronische buikpijn. Bij kinderen van 7 jaar heeft 1 op de 3 kinderen dagelijks ernstige buikpijn. Voor deze aandoening zijn allerlei termen in omloop; 'prikkelbaar darmsyndroom' of 'spastische dikke darm'.

Snelle diagnose, behandeling op maat

Oorzaken van buikpijn kunnen verschillend zijn. Op de buikpijn poli worden als het even kan, op één ochtend alle onderzoeken gedaan om te achterhalen wat de oorzaak van de buikpijn is. Dat kan obstipatie of een intolerantie voor lactose zijn. Als er geen medische oorzaak is voor de buikpijn, maar er is bijvoorbeeld sprake van spanningen, dan kan DeKinderkliniek ook psychologische begeleiding of buikpijn yoga bieden.

Buikpijn poli

Voor alle medische en niet-medische zorg voor uw kind



DeKinderkliniek is een centrum voor alle zorg rond uw kind: medisch en niet-medisch. Wij streven naar de beste zorg in een kind- en oudervriendelijke omgeving. Bij alles wat wij doen staat het kind centraal.

Hospitaalweg 1
1315 RA ALMERE
036 – 763 00 30

De onderzoeken vinden allemaal op één ochtend plaats. Eerst doet de kinderarts een algemeen onderzoek. Hierna volgt indien nodig een zogenaamde H2 – ademtest op de dagbehandeling van DeKinderkliniek. Hiermee wordt bepaald of er sprake is van een intolerantie voor lactose. Eventuele obstipatie wordt op dezelfde ochtend behandeld, doormiddel van een voedings instructie, toiletadviezen, medicijnen en indien noodzakelijk wordt op de dagbehandeling de ontlasting op gang gebracht. Op de buikpijnpoli kan ook de diëtist informatie geven over aanpassingen van het eetpatroon die kunnen helpen bij het voorkomen of verminderen van de buikpijn.

Na ongeveer twee weken volgt een afspraak om de uitslagen van de onderzoeken te bespreken en de behandeling eventueel aan te passen.

Belangrijk

Voor H2-ademtest is het belangrijk dat uw kind nuchter op de buikpijnpoli komt. U kunt wel een ontbijt meenemen voor als de test is afgenomen.

Afspreken

Voor een afspraak bij de buikpijnpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.